



TÍTULO



SANCONGRESS®

Tiempo de estancia hospitalaria en la artroplastia de cadera.

INTRODUCCIÓN

La artrosis es la causa más habitual en el reemplazo total de la cadera, esta afecta a personas de mediana y avanzada edad. La artroplastia de cadera persigue la disminución del dolor y la mejora de la movilidad de la articulación.

OBJETIVOS:

General.-

Disminuir el tiempo de estancia hospitalaria en la artroplastia de cadera.

Específicos.-

Minimizar las complicaciones postquirúrgicas de la artroplastia de cadera.

Crear un plan de actuación individualizado.

SANCONGRESS®

SECRETARÍA TÉCNICA:

Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@34enfermeriatraumatologia.com / [www. 34enfermeriatraumatologia.com](http://www.34enfermeriatraumatologia.com)

Gestión y planificación al alta desde el ingreso hospitalario.

Valoración integral de carácter multidisciplinar.

MATERIAL Y MÉTODO

Estadística de pacientes intervenidos de artroplastia de cadera en la unidad de Traumatología del Htal Dr Negrín en los últimos seis meses del año 2017.

RESULTADOS

- Recuperación funcional y tratamiento rehabilitador.
- Mejora de la calidad de vida con disminución de los costes asistenciales.
- Reinserción del paciente a su entorno y rutina habitual en el menor tiempo posible.

CONCLUSIONES:

Mejorar la situación general del paciente al alta.

BIBLIOGRAFÍA

- Serra J.A, Garrido G, Vidan M, Marañón E, Brañas F, Ortiz J, (Epidemiology of hip fractures in the elderly in Spain). An Men Interna Madr Spain 1984. Agosto 2002;19(8) 389-95.
- Pandey R, McNally E, Ali A, Bulstrode C. The role of MRI in the diagnosis of occult hip fractures. Injury. Enero 1998;29 (1) 61-3.
- Perez JV, Warwick DJ, Case CP, Bannister GC. Death after proximal femoral fracture an autopsy study. Injury. Mayo 1995;26 (4):237-40.