

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO

DISMINUCIÓN DE LA APARICIÓN DE FLICTENAS EN LA APLICACIÓN DE MEPITEL EN LA CURA DE HERIDAS QUIRÚRGICAS DE PTR.

INTRODUCCIÓN

La PTR es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes en COT y la aparición de flictenas en el postoperatorio es una complicación muy frecuente.í

OBJETIVOS

Valorar si la aparición de flictenas postoperatorias en PTR se relaciona o no con la aplicación de Mepitel en la herida quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO

Se valoran 331 PTR realizadas en el año 2018, de los cuales 106 fueron hombres y 225 mujeres. De ellas, fueron 177 derechas y 154 izquierdas. SE alternó la aplicación de Mepitel en las curas dentro de cada género.

RESULTADOS

De los 53 hombres a los que se les aplicó Mepitel, a 10 (18%) les aparecieron flictenas y a 43 (82%) no.

De los 53 hombres a los que no se les aplicó Mepitel, a 20 (38%) les aparecieron flictenas y a 33 (62%) no.

De las 113 mujeres a las que se les aplicó Mepitel, a 25 (22%) les aparecieron flictenas y a 88 (78%) no.

De las 112 mujeres a las que no se les aplicó Mepitel, a 48 (43%) les aparecieron -flictenas y a 64 (57%) no.

CONCLUSIONES

La aplicación de Mepitel reduce la aparición de flictenas postoperatorias en torno a un 20%

BIBLIOGRAFÍA

1. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK. 2005; 1(3): 104-109.
2. Waring M, et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care.2011; 20(9): 412-422.