

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO

Sindactilia. A propósito de un caso.

INTRODUCCIÓN

Se trata de la fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre sí. Se clasifica como simple cuando sólo afecta a tejidos blandos o como compleja cuando abarca o dedos o uñas de dedos adyacentes. Tiene una incidencia de 1 entre 2000-3000 nacidos vivos. Llega a presentarse de manera bilateral y simétrica en un 50% de los pacientes, siendo los dedos más afectados, en sentido descendente: tercero y cuarto, quinto y cuarto, segundo y tercero, y por último, debido al desarrollo más temprano del pulgar, el primer dedo con el segundo dedo con un 3%.

Con este trabajo queremos dar a conocer como se realiza la intervención quirúrgica, el tipo de anestesia que se requiere y el material que hay que preparar por parte de enfermería para la citada cirugía.

OBJETIVOS

Mostrar como se solucionó la citada malformación en un niño varón de 17 meses cuyo diagnóstico se produjo al nacer, así como indicar que material quirúrgico hay que preparar para dicha cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO

Exposición y descripción de un caso clínico

RESULTADOS

Difundir la técnica de la sindactilea. Así como el resultado final de dicha cirugía en un niño de 17 meses de edad, teniendo en cuenta las complicaciones asociadas que hubo en el postoperatorio inmediato.

CONCLUSIONES

La solución de la sindactilea se logra con la intervención no demasiado compleja restableciendo la funcionalidad, así como mejorando el aspecto estético en la mano afectada. Enfermería debe estar preparada para cualquier complicación que pueda surgir intra como postoperatoriamente.

BIBLIOGRAFÍA

Vidal Ruiz CA, Pérez-salazar Marina D, Calzada Vázquez-Vela C. Anómalias congénitas más comunes de la mano. Rev. Mexicana de ortopedia pediátrica. 2012; Vol. 14(1): 5-11