

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO

¿CUÁL? ¿DÓNDE? ¿CÓMO? CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO EN EL ÁMBITO QUIRÚRGICO.

INTRODUCCIÓN

Los catéteres venosos periféricos (CVP) se canalizan a través de una vena periférica, normalmente ubicada en las extremidades superiores (dorsales metacarpianas, radial, cubital, basílica, cefálica) y excepcionalmente las extremidades inferiores si las primeras son inaccesibles.

En la actualidad se dispone de gran tipología de catéteres dependiendo de numerosas variables. Entre ellas podemos encontrar aquellas relacionadas con el paciente (edad, tipo de afección...), con el tipo de tratamiento a infundir (duración, agresividad...) y características del propio catéter.

En el área quirúrgica, la vía venosa periférica es de elección en la mayoría de intervenciones quirúrgicas. Es por este motivo que se pretende proporcionar información evidenciada para trabajar de manera unificada mejorando la calidad asistencial.

OBJETIVOS

Proporcionar una serie de consejos evidenciados para instaurar un catéter venoso periférico en el ámbito quirúrgico.

Aumentar el conocimiento del personal enfermero relacionado con el paciente quirúrgico.

Evitar complicaciones posibles debido a la inserción de catéteres venosos periféricos inadecuados.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un trabajo descriptivo a través de una búsqueda bibliográfica y basado en material evidenciado. Se emplea contenido obtenido a través de soporte informático.

RESULTADOS

En quirófano la tipología, localización y el modo de punción del acceso venoso periférico variará dependiendo, a grandes rasgos de: tipo de intervención y paciente, y la urgencia de la actuación quirúrgica a realizar.

Partiendo de esta base, se ha podido recopilar una serie de consejos para optimizar los beneficios del catéter periférico según zona de punción, calibre, longitud, material y modo de fijación.

CONCLUSIONES

Este trabajo nos permitirá elegir adecuadamente el dispositivo de acceso venoso teniendo en cuenta las circunstancias y la actividad sanitaria a realizar. Sopesando siempre el riesgo-beneficio de la actuación.

SECRETARÍA TÉCNICA:

SANICONGRESS®

Santiago de Lés, 8. 46014 Valencia

Tel.: +34 902 190 848

sanicongress@35enfermeriatraumatologia.com

www.35enfermeriatraumatologia.com

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

En el área quirúrgica se deberá adecuar el uso de estos dispositivos también teniendo en cuenta la duración del postoperatorio.

BIBLIOGRAFÍA

Band JD, Gaynes R. Prevention of intravascular catheter-related infections. Harris A, editor. Waltham; 2017;52:1087.

Grady NPO, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. 2011;52.

Ministerio de Sanidad SS e I, editor. Guía Práctica Clínica sobre Terapia Intravenosa con Dispositivos no permanentes en adultos. 2014.

SECRETARÍA TÉCNICA:

SANICONGRESS®

Santiago de Lés, 8. 46014 Valencia

Tel.: +34 902 190 848

sanicongress@35enfermeriatraumatologia.com

www.35enfermeriatraumatologia.com