

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO

PACIENTE AISLADO EN COT.PROTOCOLO DE ACTUACION EN EL HUSA

INTRODUCCIÓN

Una IQ en un paciente que requiere aislamiento de contacto por un germen multirresistente necesita una actuación específica en el QFNO

OBJETIVOS

- Evitar la transmisión del agente infeccioso
- Racionalizar recursos materiales y humanos

MATERIAL Y MÉTODO

- Se identifica a la Enfermera RESPONSABLE (Circulante, de Anestesia) que dirige todo el proceso desde la entrada a la salida del paciente, coordinando la mínima circulación de personal y la suficiente provisión de guantes, no necesariamente estériles.
- El celador, con vestimenta quirúrgica más bata y guantes, traslada al paciente al Qfno con la cama cubierta con una sábana.
- Colocación del paciente en la mesa, se saca la cama vacía fuera del Qfno y se cubre con otra sábana.
- Realización de técnica anestésica, con bata y guantes, que se desechan a continuación.
- Colocación del paciente en postura quirúrgica, retirando textil, el celador al salir desecha bata y guantes.
- Preparación del campo quirúrgico estéril, y realización de la técnica quirúrgica. La Circulante utiliza guantes si realiza intervención que requiera contacto con el paciente, desechándolos al finalizar cada vez, actuando igual el equipo de anestesia. La responsable coordina y vigila el estricto cumplimiento del protocolo de aislamiento.
- Al finalizar, el equipo quirúrgico desecha calzas, bata, guantes, mascarilla y gorro antes de salir del Qfno, en contenedor apropiado.
- Se traslada al paciente a la cama, cubriéndola con sábana, y el celador, con guantes, lo traslada al box específico de URPA.
- Recogida de material y limpieza del Qfno según el protocolo para el germen específico (en COT del HUSA el prevalente es el MRSA)

SECI RESULTADOS

SANICONGRESS®

Santiago de Lé, 8. 46014 Valencia

Tel.: +34 902 190 848

sanicongress@35enfermeriatraumatologia.com

www.35enfermeriatraumatologia.com

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

No hay constancia de transmisión de germen a otros pacientes o Qfnos.

CONCLUSIONES

Dos medidas básicas y sencillas, como una Enfermera Responsable y Guantes no necesariamente estériles fuera del campo quirúrgico son suficientes para minimizar el riesgo de transmisión del germen.

BIBLIOGRAFÍA

Plataformas Medline Plus, Medwave, Quirófano.net; Plan Nacional de Resistencia a antibióticos; Revista de Investigación de calidad Sanitaria; Microbiología médica Murray 7ª edición

SECRETARÍA TÉCNICA:

SANICONGRESS®

Santiago de Lés, 8. 46014 Valencia

Tel.: +34 902 190 848

sanicongress@35enfermeriatraumatologia.com

www.35enfermeriatraumatologia.com